

Capio Medocular

Synfelskirurgi - Behandlingsrekommendationer

Ålder	Synfel			1:a hand	Alternativ behandling
Äldre än 50 år/Yngre än 50 år och ålderssynt	Alla synfel	Torisk lins (TIOL) om ast ≥ 1 D		CLE/RLE	ELSA
Ålder	Närsynt - sf ekv	Hornhinnetjocklek μm kvar under behandlad yta	Torra ögon Horhinn sjukdom	1:a hand	Alternativ behandling
Yngre än 50 år ej ålderssynt	< 4 D	Tjock hornhinna > 300	Nej	LASIK/ELSA/ICL	—
			Ja	ICL	ELSA
	4 - 7 D	Tjock hornhinna > 300	Nej	LASIK/ICL	M-ELSA
			Ja	ICL	M-ELSA
			Tunn hornhinna < 300	→	ICL
	> 7 D	→	→	ICL	—
	> 3 D astigmatism	→	→	TICL	—
Ålder	Översynt - sf ekv	Hornhinnetjocklek μm kvar under behandlad yta	Torra ögon	1:a hand	Alternativ behandling
Yngre än 50 år ej ålderssynt	< 3 D	Tjock hornhinna > 300	Nej	LASIK/ELSA/ICL	—
			Ja	ICL	—
		Tunn hornhinna < 300	→	ICL	ELSA
	> 3 D	→	→	ICL	—
	≥ 1 D astigmatism	Tjock hornhinna > 300	→	TICL/LASIK/ELSA	BIOPTICS

ELSA=LASEK

M-ELSA=Mitomycin efter ELSA-behandling CLE=RLE

BIOPTICS=två planerade behandlingmetoder

Version 3 GH 100930

